

Puntos que debe saber sobre la Tuberculosis

- En los países donde se disminuye la infección humana por *M. Tuberculosis* y no se controla la infección bovina, el *M. bovis* podría adquirir un papel preponderante en la tuberculosis pulmonar del hombre.

- El hombre que sufre de tuberculosis pulmonar debido al *M. bovis*, puede a su vez retransmitir la infección a los bovinos.

- El control de la tuberculosis bovina es importante no solo porque constituye una fuente de infección humana, sino también por las pérdidas económicas que ocasiona.

- El hombre puede transmitir *M. tuberculosis* a monos, perros, gatos, y aves psitáceas.

Medidas de prevención a ser tomadas para evitar el contagio de su finca

1- Realice el saneamiento de su ganado periódicamente (cada 6 meses).

2- No introduzca ganado sin antes conocer su procedencia (finca saneada y libre de la enfermedad),

3- No compre ganado nunca sin antes realizarle el saneamiento de Brucelosis y Tuberculosis.

4- Consulte a la Dirección General de Ganadería antes de salir a comprar ganado, allí se le indicarán fincas sin problemas sanitarios.


5- Si algún animal reacciona al diagnóstico, exija las pruebas complementarias para el resultado final, y deberán ser realizadas por el personal oficial correspondiente.

6- Cualquier animal que presente enflaquecimiento, tos frecuente, dificultad respiratoria y bajo rendimiento, debe ser aislado y notificar al Médico Veterinario oficial de su zona.

Para mayor información dirigirse a:
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Programa Brucelosis y Tuberculosis Bovina
Ciudad Ganadera, Santo Domingo, D.N.
Tel. 535-9689 Ext 272, Fax 533-5863



SECRETARIA ESTADO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
Dirección de Sanidad Animal



¿Qué es la tuberculosis?

Es una enfermedad transmisible, causada por un microorganismo del genero *Mycobacterium*. Es **altamente contagiosa**



¿Quiénes pueden ser afectados?

Especies bovina, porcina, ovina, caprina, canina, felina y humanos

¿Como se contagia el hombre?

A través del consumo de productos lácteos crudos sin hervir y pasteurizar procedentes de animales infectados. También por vía aerógena o por contacto directo.



¿Quiénes son las personas mas expuestas a ser contagiadas?

- Carniceros y empleados de mataderos.
- Ordeñadores y personal que labora con animales infectados.
- Empleados que laboran en queserías, dulcerías y puestos de venta de leche cruda.



¿Cuales órganos pueden ser afectados y alojan el microorganismo?

Pulmones, riñones, glándulas mamarias, sistema digestivo, sistema inmunitario (ganglios linfáticos) y genitales femeninos.

¿Cómo es el contagio entre los bovinos?

Cualquier animal infectado que sea diagnosticado o que presente síntomas, disemina los microorganismos con enfermedad vía aerógena o por la saliva.

Perdidas por tuberculosis

- Disminución en la producción de leche de un 10%
- Bajo rendimiento en la ganancia de peso al crecimiento 15-30%.
- Pérdidas por eliminación de animales positivos.

