

AVES DEPORTIVAS, DE COMBATE O DE LIDIA.

Los gallos, por el contacto frecuente entre peleas son más susceptibles al virus de Influenza Aviar y de esta manera pueden contagiar a los demás.

RECOMENDACIONES:

* Mantenerlos separados de los demás por 21 a 30 días después de las peleas.

* Seguir un control sanitario.

* Mantener un muestreo repetido para pruebas de laboratorio (al menos cada 60 días).

LAS MONAS (gallos para traquear) PUEDEN SER EL MAYOR PELIGRO DE CONTAGIO ENTRE TRABAS



DESINFECTANTES RECOMENDADOS

PRODUCTO	SOLUCION
Hidróxido de sodio	2%
Ortofenilfenato de sodio	2%
*Acido acético	2%
*Acido cítrico	2%
Carbonato de sodio	2%
Formalina	2%
Glutaraldehído	2%
Fenoles sintéticos	4%
Cresoles (creolina)	10%
Formaldehído	4%

***Recomendamos para el uso de granjas, vehículos, instalaciones industriales y otros materiales por ser biodegradables, ecológicos, no tóxicos, no irritantes, no corrosivos.**

PROTEJA SU CRIADERO REPORTE LOS CASOS SOSPECHOSOS

**COMUNIQUESE CON EL
VETERINARIO DE LA ZONA O A LA
SUB DIRECCION REGIONAL
PECUARIA O LLAMA A LA DIRECCION
GENERAL DE GANADERIA.**



SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

COMO PREVENIR INFLUENZA AVIAR EN LAS AVES DE CORRAL



**Ciudad Ganadera, Santo Domingo,
D. N. República Dominicana
Teléfono: 809-535-9689
Fax : 809-533-8765**

RECONOZCA LA INFLUENZA AVIAR

SINTOMAS:

- * **Inflamación de la cabeza**
- * **Lagrimo**
- * **Estertores (roco)**
- * **Plumas erizadas**
- * **Disminución del consumo de alimento**
- * **Disminución de la postura**
- * **Incoordinación**
- * **Temblores**
- * **Diarreas**
- * **Coloración oscura de las crestas**
- * **Hemorragias nasales**
- * **Muerte repentina con o sin síntomas de la enfermedad**



MEDIDAS BASICAS DE BIOSEGURIDAD:

LIMPIE Y DESINFECTE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS

Cuando entre y salga de una granja o transporte animales, desinfecte las ruedas, pisos, camas o baúles del vehículo, así como jaulas o equipos que estuvieron en contacto.

LAVE PRIMERO CON UN DETERGENTE FUERTE Y DESINFECTE CON UN PRODUCTO RECOMENDADO.

USE ROPA ADECUADA

El uso de overoles y botas de protección que puedan ser lavados y desinfectados de manera adecuada son importantes para las personas que cuidan o alimentan los animales, el virus se contagia a través de las manos y la vestimenta (ropa, calzados y utensilios).

MANTENGA LEJOS LOS VISITANTES

Evite que visitas tengan contacto con las aves, de igual manera no visite otras granjas o criaderos. De ser necesario use overol y aplique desinfectante posteriormente a las visitas.

CRIANZA TODO DENTRO TODO FUERA

Practique el manejo de aves por grupo de edad y especie, no introduzca animales de orígenes desconocidos, proteja sus aves bajo techo y críe cada lote separado. Evite criar las aves sueltas o al aire libre.

LIMPIE Y DESINFECTE MUY BIEN CADA AREA CADA VEZ QUE SAQUE UN GRUPO DE AVES y ANTES DE INTRODUCIR UN NUEVO GRUPO



EVITE EL CONTACTO ENTRE AVES DOMESTICAS Y SILVESTRES

Las aves silvestres y acuáticas pueden ser portadoras de enfermedades que en ellas no se manifiestan clínicamente, pero si pueden transmitir las.

EVITE CRIANZAS MIXTAS DE ESPECIES DE AVES Y OTROS ANIMALES.